


ExDEGA v1.6.8
(RNA-Seq & Microarray)
User Manual

ebiogen

<목 차>

1. 엑셀기반 DEG 분석 (ExDEGA v.1.6.8)

2. MeV Software 이용 Clustering Heatmap 작성

3. KEGG DB 기반 Pathway 분석

4. DAVID tool을 이용한 Functional Annotation 분석

5. MSigDB기반 GSEA 분석

6. String-db tool을 이용한 Network 분석

1. 엑셀기반 DEG 분석 (ExDEGA v.1.6.8)

㈜이바이오젠은 Quant-Seq, mRNA-Seq, Total RNA-Seq 과 Microarray data 를 엑셀 기반에서 DEG 를 쉽게 분석할 수 있도록 분석보고 시 ExDEGA (Excel based Differentially Expressed Gene Analysis) tool 을 함께 제공한다. ExDEGA 분석툴은 ㈜이바이오젠이 연구자들이 Microarray 및 RNA-Seq 데이터를 보다 쉽게 다루고 원하는 데이터를 쉽게 얻을 수 있도록 사용자 편의를 최대한 반영한 분석툴이고 엑셀 프로그램 안에서 다양한 분석을 직관적으로 수행할 수 있도록 개발되었다. ExDEGA 분석툴은 사용자들의 요구사항을 지속적으로 반영하여 데이터분석과 엑셀 사용에 익숙하지 못한 연구자들도 쉽게 사용이 가능하도록 계속 업데이트 될 예정이다.

이바이오젠에서 제공하는 Microarray data 와 RNA-Seq data (엑셀 데이터)를 열기 전에 함께 제공한 ExDEGA(버전).zip 파일의 압축을 풀고 setup 을 실행하면 분석툴이 설치된다(그림 1-1).

설치가 완료되고 보고된 엑셀데이터를 열면 자동으로 ExDEGA 분석툴이 엑셀에 반영된 것을 확인할 수 있다. 참고로 ExDEGA 설치 전에 실행 중인 엑셀 파일이 있으면 종료 시킨 후 다시 실행해야 ExDEGA 를 사용할 수 있다.




그림 1-1. ExDEGA set up

ExDEGA Report 엑셀 파일을 열면 왼쪽에 Gene Category 분석 창과 가운데에 mRNA expression data, 오른쪽에 DEG 분석 창이 실행된다 (그림 1-2).

Gene Category 분석 창에서는 기본 설정된 Gene ontology (GO)와 사용자가 원하는 대로 gene category 를 구성하여 분석할 수 있고 DEG 분석과 함께 연동하여 데이터를 쉽게 얻을 수 있다. DEG 분석 창에서는 Fold change, Normalized Data (log2), p-value 등을 선택하여 원하는 데이터를 쉽게 얻을 수 있고 Gene category chart 통해 전체적인 발현 패턴을 확인할 수 있다. 뿐만 아니라, DEG 분석 창에서 Scatter Plot, Volcano Plot, Venn Diagram 을 직접 그릴 수 있고 선별된 유전자들을 대상으로 Clustering heatmap 을 작성하기 위한 MeV 프로그램 input file 을 자동으로 만들 수 있다. Gene expression graph, Gene search 기능도 이용할 수 있어 연구자가 RNA-Seq data 를 쉽게 활용할 수 있다.




그림 1-2. mRNA expression data format made in E-Biogen

1-1. Gene Category 사용 방법

mRNA expression data 는 수 만개의 유전자를 포함하기 때문에 유전자를 한 개씩 분석하기 보다 기능별로 그룹을 지어 분석을 하는 것이 용이하다. 이를 위해 많은 연구자들이 gene ontology (GO)를 활용한다. GO 는 비슷한 기능의 유전자들을 묶어 놓은 그룹이라고 생각하면 이해하기 쉽다.

Gene Category 창은 수많은 GO 중 임의로 15 개를 선택하여 관련 유전자를 필터링 할 수 있도록 만들어 놓은 것이다. 예를 들어, Aging 관련 유전자만 분석을 원할 경우, Gene Category 창에서 Aging 을 선택하면 해당 유전자 리스트만 필터링 된다(그림 1-3).

그리고 Gene Category 의 여러 항목들을 동시에 만족하는 유전자를 필터링할 수 있고 적어도 한 항목만이라도 포함하는 유전자를 보고자 하는 경우도 필터링이 가능하도록 "AND"와 "OR" 기능을 갖추고 있다.




그림 1-3. Gene ontology (Aging) selection

가장 왼쪽 상단에 'View All Data' 버튼을 누르면 필터를 모두 해제되어 다시 전체 결과를 볼 수 있고 15 개의 GO 중 관심 기능이 없다면 'Gene Category Settings' 버튼을 이용하여 Quick GO site 에서 다른 GO 를 추가할 수 있다(그림 1-4). '?' 버튼을 누르면 GO 추가하는 방법이 자세히 설명되어 있다.




그림 1-4. Gene category settings

만약 원하는 유전자 그룹 목록을 알고 있다면, 직접 입력하여 새로운 Gene Category 를 추가할 수도 있다. Gene Category Settings 버튼을 누른 `후 New 를 선택하고 원하는 gene symbol list 입력(or 복사-붙여넣기) 한 뒤, Gene category 이름 설정 후 저장하면 새로운 GO category 를 확인할 수 있다(그림 1-5-a,b).




그림 1-5-a. Adding Genes to make a new gene category




그림 1-5-b. Adding Genes to make a new gene category

1-2. Significant Gene Selection 사용 방법

오른편의 DEG Analysis 부분에서 "Significant Gene Selection" 창은 전체 결과 중 **A** 와 **B** 를 비교한 결과에서 유의하게 발현 차이가 나는 유전자를 필터링 할 수 있도록 만들어 놓은 것이다. 예를 들어, **A** 기준으로 **B** 에서 발현이 2 배 이상 증가 또는 감소하고, Normalized Data (log2)값이 4 이상이고, p-value 값이 0.05 이하인 유전자(반복 실험한 데이터의 경우만 제공)를 선택하면 59 개의 유전자가 필터링 된다(그림 1-6).

그리고 여러 개의 비교그룹에서 동시에 Significant gene 을 선별하고자 할 경우와 적어도 한 비교그룹에서 Significant gene 을 선별하고자 할 경우에는 "AND"와 "OR" 기능을 사용하면 된다.




그림 1-6. Significant gene selection

Gene Category 와 Significant gene selection 은 연동 가능하다. 그림 1-7 에서처럼 Gene Category 의 Cell differentiation 을 선택하면 5 개의 유전자가 필터링 된다(그림 1-7). 5 개의 유전자는 본 데이터에서 Cell differentiation 관련 유전자들 중 B/A 비교그룹에서 유의하게 발현이 증가 또는 감소한 유전자를 의미한다.




그림 1-7. Significant genes related to Cell differentiation

실험 결과에 따라 발현 변화값 (fold change), p-value, normalized data(log2) 기준을 조정할 수 있고 반복 실험인 경우만 p-value 를 선택할 수 있다.

"View Gene Category Chart" 버튼을 누르면 각 GO 관련 유전자 중 발현이 유의하게 차이 나는 유전자의 %와 수가 그래프로 그려진다. 본 분석을 통해 어떤 GO 의 유전자들이 상대적으로 많은 발현 변화가 있었는지를 확인할 수 있다. 전체 데이터 상태에서 Significant Gene Selection 의 비교 그룹을 선택하고 "View Gene Category Chart"를 클릭하면 증가/감소한 유전자들 대상으로 GO Chart 가 생성된다. 그래프의 각 영역을 클릭하면 해당 유전자들이 필터링 된다. 예를 들어 왼쪽의 Pie chart 의 특정영역을 클릭하면 해당 GO 의 증가/감소된 유전자가 함께 필터링 되고 오른쪽의 증가/감소된 bar chart 에서 bar 상단의 숫자는 해당 유전자 수이며 bar 를 클릭했을 때 해당 유전자가 필터링 된다(그림 1-8).




그림 1-8. View Gene Category Chart

1-3. Analysis Graph 사용 방법

DEG Analysis 부분에서 "Analysis Graph" 창을 펼치면 아래 그림 1-9 와 같이 Scatter Plot, Volcano Plot, Venn Diagram 을 엑셀에서 쉽게 그릴 수 있다.




그림 1-9. Analysis Graph Tool

1-3-1. Scatter plot

첫번째 Scatter Plot 은 오른쪽에 샘플 비교 그룹과 Fold threshold line 을 선택하고 "Graph View"를 클릭하면 왼쪽에 선택한 비교 그룹을 대상으로 Scatter Plot 이 자동 생성된다. Plot 에서 특정 spot 을 클릭하면 해당 유전자명이 표시되고 마우스 오른쪽을 클릭하여 지울 수도 있다. 그리고 여러 개의 유전자를 동시에 표시하고 싶다면 "Gene Select(ID Input)" 창에 해당 유전자 ID 를 복사하여 입력하고 "Add"를 클릭하면 Gene Symbol 이 자동 생성된다(그림 1-10).




그림 1-10. Analysis Graph Tool – Scatter Plot

1-3-2. Volcano plot

두 번째, Volcano Plot 은 반복 실험이 된 경우에만 분석 가능하다. Volcano Plot 은 Scatter Plot 의 기능과 거의 동일한데 오른쪽에 샘플 비교 그룹과 Fold threshold line, p-value(반복실험시)를 선택하고 "Graph View"를 클릭하면 왼쪽에 선택한 비교 그룹을 대상으로 Plot 이 자동 생성된다. Plot 에서 특정 spot 을 클릭하면 해당 유전자명이 표시되고 마우스 오른쪽을 클릭하여 표시를 지울 수도 있다. 그리고 여러 개의 유전자를 동시에 표시하고 싶다면 "Gene Select(ID Input)" 창에 해당 유전자 ID 를 복사하여 입력하고 "Add"를 클릭하면 Gene Symbol 이 자동 생성된다(그림 1-11).




그림 1-11. Analysis Graph Tool – Volcano Plot

1-3-3. Venn diagram

세 번째, Venn Diagram 을 통해 2 개, 3 개 또는 4 개까지의 비교그룹을 대상으로 Venn Diagram 을 작성할 수 있다. Venn Diagram 을 그릴 샘플 비교그룹과 Fold Change, p-value(반복실험시)을 선택 후, Diagram View 를 클릭하면 결과를 확인할 수 있으며 그룹은 최대 4 그룹까지 선택 가능하다. 아래의 그림은 B/A 와 C/A, C/B 결과 중, fold change 값이 2 이상 up, down 된 list 를 가지고 Venn Diagram 을 작성한 결과이다(그림 1-12).




그림 1-12. Analysis Graph Tool – Venn Diagram

Venn Diagram 결과에서 표시되는 형식은 다음과 같다(그림 1-13).

1. ***기울어진 숫자*** : 2fold 이상 up-regulated 된 gene 수
2. **빨간색 숫자** : regulation 이 대조되는 gene 수
3. **밑줄 친 숫자** : 2fold 이상 down-regulated 된 gene 수




그림 1-13. For example of up, down, contra-regulated in Venn Diagram

Venn Diagram 각 영역에 어떤 유전자들이 있는지 확인할 수도 있다. 예를 들어, B/A 에서만 fold change 값이 2 이상 up 이 되는 유전자를 보고 싶으면, Venn Diagram 에서 B/A 에서만 해당되는 영역을 찾아 마우스 오른쪽 클릭하면 fold change 값이 2 이상 up 된 유전자 list 3 개가 엑셀 sheet 에 filter 된다(그림 1-14).




그림 1-14. Filtering 2fold up-regulated gene list in Venn Diagram

ExDEGA 에서 제공되는 모든 이미지는 오른쪽마우스를 눌러 'Save image' 버튼을 통해 저장이 가능하다(그림 1-15).



그림 1-15. Save image

1-4. Clustering Heatmap Support 사용 방법

ExDEGA 의 DEG Analysis 에서는 Significant Gene Selection 또는 Venn Diagram 등을 통해 Data Mining 을 수행한 후 정리된 유전자 리스트를 대상으로 Clustering Heatmap 을 쉽게 작성할 수 있도록 지원한다. 당사에서 추천하는 Clustering Heatmap 프로그램은 MeV 인데 ExDEGA 에서 MeV 용 Input file 을 자동 생성해 주고 MeV 에서 해당 파일을 불러오면 된다. 이후의 Clustering 방법 및 이미지 가공 및 저장 방법은 본 메뉴얼 "2. MeV Software 이용 Clustering Heatmap 작성" 부분을 참고하면 된다.

그림 1-16 에서 필터링 된 유전자 리스트를 대상으로 Clustering Heatmap 을 작성하려면 크게 두 종류의 데이터를 이용할 수 있는데, 첫 번째는 Fold change 값을 이용할 시 Type 부분에 Fold change 를 체크하고 Export Data Select 에서 Heatmap 에 표현할 비교그룹을 체크하여 "Data Export"를 클릭한 후 "(input 명).txt"로 저장하면 된다.

두 번째는 개별 샘플의 발현 값인 Normalized Data 로 표현하고자 할 때 Z-Score 를 체크하고 확인하고자 하는 샘플을 체크하여 "Data Export"를 클릭한 후 "(input 명).txt"로 저장하면 된다. 단, Z-score 로 그릴 때는 샘플 3 개 이상에서만 가능하다.

*참고로 Z-score 는 일반적으로 평균으로부터 얼마만큼 떨어져 있느냐를 판단하는 지표이다.

계산방식은 Normalized data 를 log10 으로 변환 후 평균값을 뺀 후 표준편차로 나누어 계산한다.

Z-score = {Normalized data (log10) – average of Normalized data (log10)}/standard deviation of Normalized data(log10)




그림 1-16. Clustering Heatmap Support

1-5. Selected Gene Plot & Gene Search 사용 방법

ExDEGA 의 기능 중에 선별한 유전자 또는 연구자가 관심있는 유전자들을 대상으로 발현 패턴을 그래프로 표현하고자 할 때는 "Selected Gene Plot" 기능을 사용할 수 있다.

선별한 유전자의 gene symbol 을 복사하여 Selected Gene Plot 창에 붙여 넣고 "Expression Plot View"를 누르면 normalized data(log2) 값, fold change(log2) 값으로 line graph 가 그려진다(그림 1-17).

그리고 특정 keyword 관련 유전자를 검색하고 싶을 때는 gene search 창을 이용하면 된다. 예를 들어 'insulin'을 검색하면 엑셀 Data Sheet 에 'insulin' keyword 을 포함하는 모든 행이 검색되어 필터링 된다(그림 1-18).




그림 1-17. Gene graph




그림 1-18. Genes related to insulin

2. MeV Software 이용 Clustering Heatmap 작성

MeV 소프트웨어는 미국의 Dana-Farber Cancer Institute에서 개발한 Microarray, mRNA-Seq 전용 분석 프로그램으로 연구자들에게 무료로 공급하고 있다. 주로 clustering 분석과 통계분석(K-means clustering, Hierarchical clustering, t-test, Significance Analysis of mRNA-Seqs, Gene Set Enrichment Analysis, EASE)을 할 수 있는 프로그램이다.

(Mev software Download 웹 주소: https://sourceforge.net/projects/mev-tm4/)

프로그램을 다운받아 압축을 풀고, MeV 또는 TMEV를 클릭해서 프로그램을 실행시킨다(그림2-1) MEV프로그램을 실행시키면 세 개의 창이 나타난다(그림2-2). 분석창은 프로그램창의 메뉴에서 file->New multiple array viewer를 통해 여러 개를 생성할 수 있고 데이터 분석은 분석창을 통해 진행한다.




그림 2-1. MeV program folder and files





그림 2-2. MeV program windows

본 자료에서는 MeV 프로그램을 이용하여 Clustering 분석 방법을 설명한다. 13페이지에서 설명한 것 같이 MeV input파일을 저장하여 이용할 수 있고, MeV 프로그램에 input할 데이터를 엑셀에서 파일 양식에 맞춰 저장하여 이용할 수도 있다.

엑셀에 clustering 하고자 하는 유전자 이름과 fold change 또는 발현값(intensity)를 가져온다(그림 2-3). 그리고 '텍스트 (탭으로 분리)'파일 형식으로 저장해야 MeV에 upload 할 수 있다. MeV에서는 2만 개 이상의 유전자는 clustering 분석을 할 수 없으므로 2만 개 이하로 유전자를 선별해야 한다. (샘플 개수에 따라 1만 5천개의 유전자를 input하여도 분석이 안 될 수 있다.)



	A	B	C
1	Gene Sym	A	B
2	AADAC	1.206164	0.036353
3	ABAT	1.370275	-0.98806
4	ABTB2	-1.2252	0.000916
5	ACAA1	0.967821	0.409114
6	ACO1	1.182995	-1.26261
7	ADAR	-1.38548	0.447132
8	ADK	1.162655	0.115935
9	ADPRHL2	-1.27991	0.11903
10	AGRN	-1.41266	0.648852
11	AGT	1.174614	0.094757
12	AGXT	1.139846	0.155035
13	AIG1	1.189145	0.068338
14	AKAP12	-0.6091	-0.80078
15	AKTIP	1.206976	0.034795
16	ALDH4A1	1.202989	0.04241
17	ANKLE2	-1.01473	-0.34572
18	ANO6	0.810152	-1.40894	0.598786
19	ANTXR2	-0.65378	-0.75912	1.412905
20	ANXA6	1.064346	0.274286	-1.33863

그림 2-3. Data format example

input 데이터 저장이 완료되면 MeV 프로그램의 분석창에서 file -> load data를 실행한다(그림 2-4). Browse를 클릭하여 input 데이터를 선택한다.




그림 2-4. Data uploading method

Analysis-> Clustering-> HCL을 선택하여 Clustering 분석을 시작한다(그림 2-5).




그림 2-5. Hierarchical Clustering Selection

Clustering 분석 시 다양한 옵션을 선택할 수 있다(그림 2-6). Gene tree를 선택하면 fold change 또는 intensity가 유사한 유전자끼리 clustering한 결과가 나온다. Sample tree를 선택하면 발현이 유사한 샘플끼리 clustering한 결과가 나온다. 당사에서 clustering 분석을 할 때 Distance Metric는 Euclidean Distance로 Linkage Method Selection은 Average linkage clustering으로 설정한다. 다른 옵션을 선택해도 된다. 옵션을 선택하고 OK를 누른다.




그림 2-6. Hierarchical Clustering Method

Clustering이 완료되면 왼쪽 메뉴에 Analysis Results에 HCL 결과가 생긴다. HCL -> HCL tree를 클릭하면 clustering 결과가 화면에 나온다(그림 2-7). 위의 tree는 sample clustering 결과이고 왼쪽 tree는 gene clustering 결과이다. 각 tree에는 distance scale bar가 있어서 tree의 길이를 가늠할 수 있다. tree의 길이는 distance이며, distance가 짧을수록 유전자 간 또는 샘플 간의 발현패턴이 유사한 것, 길수록 발현패턴이 상이한 것이다.




그림 2-7. Hierarchical Clustering Result

clustering 결과는 이미지의 크기와 색상을 조절하여 원하는 형태의 이미지를 만들 수 있다(그림 2-8, 2-9)




그림 2-8. Clustering image size control

Display -> Set Color Scale Limits을 누르면 color scale bar의 최소값, 중간값, 최대값을 설정할 수 있다. 보통 log2(fold change)는 최소값과 최대값은 같은 크기에 부등호만 바꿔주고(예: min:-3, max:3) 중간값은 0으로 설정해 준다(그림 2-9). 이렇게 하면 up-regulated genes은 red, down-regulated genes은 blue으로 나타나게 된다.




그림 2-9. Clustering image color scale setting

원하는 이미지 조절이 완료되면 File -> Save image를 눌러 이미지를 저장한다. 이때 파일 이름에 파일 확장자명(예: .jpg)을 꼭 기입하여야 이미지 파일로 저장이 된다(그림 2-10).




그림 2-10. Clustering image save

3. KEGG DB 기반 Pathway 분석

mRNA-Seq 분석 결과에서 up/down-regulated 유전자들이 어떤 Pathway에 속하는지 확인하고자 한다면 KEGG에서 제공하는 KEGG Mapper를 이용하면 된다. 사용방법은 그림 3-1과 같은 순서로 진행된다.



그림 3-1. KEGG Mapper tool analysis process

그림 3-2는 mRNA-Seq report에서 2fold, normalized data(log2)>4을 기준으로 선별한 유전자를 KEGG 분석하는 과정이다.

* KEGG input 값은 excel 파일의 Annotation 항목 앞에 제작되어 있다.

오른쪽 필터에서 Fold change와 Normalized Data(log2) (반복실험의 경우 p-value) 값을 지정하고, 확인하고자 하는 Fold change 조합을 선택하여 필터를 적용한다.

필터를 적용하여 선별된 유전자의 KEGG input [Entrez ID, FC Color(#숫자,black)] cell을 함께 복사하여, KEGG 분석에 사용할 것이다.




그림 3-2. KEGG Mapper tool analysis process

그림 3-3과 같이 KEGG Mapper 웹페이지(http://www.genome.jp/kegg/tool/map_pathway2.html)에 접속하고 Search & Color pathway 링크에 들어가면 아래와 같은 화면이 보여진다. 분석하고자 하는 유전자의 species를 선택하고, 'primary ID'는 KEGG identifiers로 선택한 뒤 'Enter objects one per line followed bgcolor, fgcolor' 창에 엑셀에서 준비해 놓은 Entrez ID, Color 항목을 복사-붙여넣기를 한다. 마지막으로 "Include aliases"와 "Use uncolored diagram" 항목에 체크를 한 후 Exec 버튼을 누른다.




그림 3-3. KEGG Mapper tool analysis process

분석결과, 입력한 유전자들이 관여하는 pathway list가 나온다(그림 3-4). pathway 이름 옆에 있는 괄호 안 숫자는 입력한 유전자 중 각 pathway에 관여하는 유전자의 수이다. 괄호 안 숫자를 클릭하면 해당 유전자 목록을 볼 수 있다. pathway 이름을 클릭하면 해당 pathway chart가 열리고 입력한 유전자의 발현 up/down (red/blue)이 색으로 표시되어 있다. Pathway 이미지는 "다른 이름으로 저장"이 가능하고 "html"으로 저장하면 이미지에 링크된 항목을 그대로 유지해서 저장이 가능하다.




그림 3-4. KEGG Mapper tool analysis result

4. DAVID tool을 이용한 Functional Annotation 분석

DAVID 는 다양한 데이터 베이스를 기반으로 유전자의 상관관계를 통계적으로 분석하여 유전자의 주요 기능을 예측하는 analysis tool 이다. 분석 과정은 그림 4-1 과 같다.




그림 4-1. DAVID tool analysis process

DAVID 에서는 3 천 개 이상의 유전자는 분석할 수 없으므로 3 천 개 이하로 유전자를 선별해야 한다. mRNA-Seq 결과에서 significant gene 을 선별하여 DAVID 분석을 한다. DAVID 홈페이지 (http://david.abcc.ncifcrf.gov/)에 접속하여 "Functional Annotation"을 클릭한다(그림 4-2).




그림 4-2. DAVID tool webpage

"Upload" 탭에서 Step 1 에서 Step 4 까지 수행한다(그림 4-3). Step 1 에서 선별한 유전자의 Gene Symbol 을 복사하고 "A: Paste a list" 창에 붙여 넣는다. Step 2 에서"OFFICIAL_GENE_SYMBOL"를 선택한다. 만약 step 1 에서 Gene Bank No.를 넣었다면 "GENEBANK_ACCESSION" 을 선택한다. Step 3 에서 "Gene List"를 체크하고 Step 4 에서 "Submit List"를 누른다. Gene Symbol 을 넣은 경우,"multiple species have been detected in your gene list"라는 창이 뜨면"확인"을 누른다.




그림 4-3. DAVID tool : Step 1 ~ Step 4

그림 2-4 와 같이 Current Background 에 일치하지 않는 종이 나오지 않았다면 좌측 "Background" Sheet 에서 알맞은 종을 선택하여 "Use"를 클릭한다. 그리고 좌측 "List" Sheet 에서 해당 종(숫자)로 표기되어 있고 가로 안의 숫자가 분석에 적용된 유전자의 개수이다. 예시에서는 59 개의 유전자 리스트를 넣었고 데이터베이스에서 기능이 밝혀진 48 개만이 Functional Annotation 분석에 이용되었다는 의미이다(그림 4-4).




그림 4-4. DAVID tool : Select Species

분석 결과를 확인하기 위해 예로 Gene Ontology 중 Biological Process 를 확인한다. "Gene_Ontology"의 "+" 표시를 클릭하여 결과 창을 열고 "GOTERM_BP_FAT"의 "Chart"를 누르면 유전자들이 관여하는 Biological Process GO 를 확인할 수 있다(그림 4-5). 관심 GO 를 클릭하면 QuickGO 데이터베이스로 연결되어 각 GO 의 정보를 확인할 수 있다. GO 의 Gene 막대를 클릭하면 해당 GO 관련 유전자들을 확인할 수 있다.




그림 4-5. DAVID tool : exploring Gene Ontology analysis result

이와 같은 방법으로 Pathway 결과를 확인해 보면 KEGG_PATHWAY database 에서 주요 Pathway 가 나온다(그림 4-6). 각 pathway 를 누르면 pathway 그림을 확인할 수 있다. pathway 그림에서 별 표시가 되어 있는 유전자가 input 유전자 중 해당 pathway 에 관여하는 유전자이다. 유전자를 클릭하면 유전자 정보도 자세히 알 수 있다.




그림 4-6. DAVID tool : exploring Pathway analysis result

DAVID 분석은 input 한 유전자들이 유의하게 관련되는 GO, pathway 등을 분석하기에 유용한 tool 이다. 즉, input 한 유전자에서 많은 유전자들이 관련되는 GO, pathway 만 결과로 나오기 때문에 input 유전자 중 적은 수가 관련되는 GO, pathway 는 결과에 나오지 않는다. 또한 input 유전자의 수가 적으면 분석 결과가 없을 수도 있다. DAVID 에서는 유전자 2 개 이상, EASE score

0.1 이하를 default 로 분석하여 이 기준에 적합한 결과를 보여준다. option 에서 이 기준을 조정하여 리스트를 더 볼 수 있다. David 분석 결과의 각 항목은 DAVID 홈페이지의 Help and Tool Manual 에 자세히 설명되어 있다(그림 4-7).




그림 4-7. DAVID Help and Tool Manual

5. MSigDB기반 GSEA 분석

GSEA 분석은 MSigDB 기반으로 유전자의 상관관계를 통계적으로 분석하여 입력한 유전자 셋의 주요 기능을 예측하고 각 유전자가 어떤 기능들에 포함되는지 overlap 분석을 제공해 준다. 분석과정은 그림 5-1 과 같다.




그림 5-1. Web based GSEA tool analysis process

MSigDB 에 접속하여 "Investigate gene sets"을 클릭하고 등록한 이메일을 입력하여 로그인을 수행한다(그림 5-2). 만약 등록이 필요할 시 "Click here"을 클릭하여 등록을 진행하면 된다(그림 5-3).




그림 5-2. GSEA main page




그림 5-3. GSEA Login page

"Gene Identifiers"입력 창에 유전자 리스트(Gene Symbol, EntrezGeneID 또는 public ID)를 입력하고 "Compute Overlaps"에 원하는 DB 를 클릭한 후 맨 아래 "compute overlaps" 버튼을 클릭한다.(그림 5-4). DB 선택 시 DB 명 앞의 파란색 글자를 누르면 해당 DB 정보를 확인할 수 있다.




그림 5-4. GSEA Analysis

분석이 완료되면 그림 5-5 와 그림 5-6 과 같이 통계적으로 유의한 Gene Set List 와 Gene/Gene-set Overlap Matrix 결과를 확인할 수 있다.




그림 5-5. GSEA Analysis Result (Gene Set)




그림 5-6. GSEA Analysis Result (Gene/Gene-set Overlap Matrix)

6. String-db tool을 이용한 gene set분석

String-db tool 은 Protein-Protein Interaction 데이터 베이스를 기반으로 유전자의 상관관계를 통계적으로 분석하여 유전자의 주요 기능을 예측하고 Network 을 build 해 주는 분석 툴이다. 분석 과정은 그림 6-1 과 같다.




그림 6-1. String-db tool analysis process

웹 기반의 String-db 에서는 100 개 이하의 유전자를 input 하는 것으로 제한되어 있고 여러 public ID 중 EntrezGeneID 사용이 좀 더 편리하다. mRNA-Seq 결과에서 significant gene 을 선별하고 String-db 홈페이지 (http://string-db.org/)에 접속하여 "Multiple proteins"을 클릭하고 "List of names" 입력 창에 유전자 리스트를 복사한다. 그리고 "Organism" 입력 창에 해당 species 학명을 입력하고 "Search"를 클릭한다(그림 6-2).




그림 6-2. Multiple proteins search

"Search" 결과 중간에 아래 그림과 같은 유전자 확인 단계가 있고 별 이상이 없으면 "continue"를 클릭하여 계속 진행한다(그림 6-3).




그림 6-3. Gene confirmation step

분석이 완료되면 그림 6-4와 같이 String DB 기반 Network 결과를 확인할 수 있고 "Analysis" 탭을 클릭하면 "Functional enrichments in your network" 결과를 확인할 수 있다(그림 6-5).
각 Functional DB 결과의 오른쪽 하단에 "more"를 클릭하면 FDR<0.05 이하에 해당하는 항목을 모두 볼 수 있다.




그림 6-4. String network result




그림 6-5. Functional enrichments result

관심 있거나 중요한 Function을 클릭하면 Network상에서 해당 유전자(단백질)들이 붉은색으로 표시되고(그림 6-6) 관심 있는 유전자(단백질)을 클릭하면 자세한 정보를 추가로 얻을 수 있다(그림 6-7).




그림 6-6. Function selection on your network




그림 6-7. Gene selection on your network

"Legend" 탭에서는 Node, Edge, Input 유전자(단백질)의 설명을 자세히 볼 수 있고(그림 6-8) "Tables/Exports" 탭에서는 Network와 유전자(단백질) 정보를 파일로 저장할 수 있다.(그림 6-9)




그림 6-8. Legend of your network




그림 6-9. Tables/Exports of your network